

病害虫（カメムシ）予察の調査結果

1 調査期間 令和3年7月21日（水）～27日（火）

2 調査結果

農事組合	カメムシ		フタオビ	イモチ
	少ない	注意		
北大和		●	なし	なし
大和		●	なし	なし
南大和		●	なし	なし
弥生区1町内		●	なし	なし
弥生区2町内		●	なし	なし
花月区1町内		●	なし	なし
花月区3町内		●	なし	なし
花月区4町内		●	なし	なし
花月区8町内		●	なし	なし
総進区2町内		●	なし	なし
総進区4・5町内1		●	なし	なし
総進区4・5町内2		●	なし	なし
徳富区学園		●	なし	なし
徳富区吉野2町内		●	なし	なし
平均		●		

※カメムシは、フェロモントラップによる追加防除の判断基準
（ななつぼし2.2匹／7日）との比較です。

3 総評

- ・ 水稻は現在出穂期から出穂揃いを迎えています。
- ・ トラップの捕獲頭数が多い地域も見られますが、防除の実施により、本田内のカメムシ発生数は抑えられています。今後の発生状況に注意してください。

新十津川町営農振興対策協議会
事務局 新十津川町産業振興課農林畜産グループ
TEL : 0125-76-2134 FAX : 0125-76-2785