

## 病害虫（カメムシ）予察の調査結果

1 調査期間 平成30年7月17日（火）～23日（月）

### 2 調査結果

農事組合	カメムシ		フタオビ	イモチ
	少ない	注意		
北大和	●		なし	なし
大和		●	なし	なし
南大和		●	なし	なし
弥生区1町内		●	なし	なし
弥生区2町内		●	なし	なし
花月区1町内	●		なし	なし
花月区3町内		●	なし	なし
花月区4町内	●		なし	なし
花月区8町内		●	なし	なし
総進区2町内	●		なし	なし
総進区4・5町内1	●		なし	なし
総進区4・5町内2	●		なし	なし
徳富区学園		●	なし	なし
徳富区吉野2町内		●	なし	なし
平 均		●	/	/

※カメムシは、フェロモントラップによる追加防除の判断基準（ななつぼし2.2匹／7日）との比較です。

### 3 総評

- ・ 水稻の生育は平年より4日遅れています。
- ・ カメムシの基幹防除は、出穂期及び出穂7～10日後が基本です。この時期にしっかり防除を行いましょう。

新十津川町営農振興対策協議会  
 事務局 新十津川町産業振興課農林畜産グループ  
 TEL : 0125-76-2134 FAX : 0125-76-2785